


GRUNDWISSEN 7. KLASSE

Terme mit Variablen

Aufgabe 1/16

Es gibt Tische, an deren Breitseite jeweils eine und an deren Längsseite jeweils zwei Personen Platz nehmen können.



Gib an, wie viele Personen Platz haben, wenn man

- a) zwei
- b) drei
- c) n

Tische an ihrer Breitseite zusammenstellt.

GRUNDWISSEN 7. KLASSE

Terme mit Variablen

Aufgabe 3/16

Berechne jeweils die Termwerte des folgenden Terms für $x \in \{-1; 0; 1\}$.


$$T(x) = \left(\frac{1}{6} - x + x^2\right) : \left(-\frac{1}{3}\right)$$

GRUNDWISSEN 7. KLASSE

Terme mit Variablen

Aufgabe 2/16

Gib zu der Figur zwei verschiedene Terme $T(x)$ an, mit denen der Flächeninhalt der abgebildeten Figur berechnet werden kann.

**GRUNDWISSEN 7. KLASSE**


Umformen von Termen

Aufgabe 4/16


Berechne und vereinfache so weit wie möglich.

$$(k - 4m)(3s - p) - (4m - 5k)(7s + 3p)$$

$$T(x) = A_{\text{Rechteck}} + A_{\text{Trapez}} = 6 \cdot 10 + \frac{1}{2} \cdot (10 + x) \cdot 4$$



$$T(x) = A_{\text{Quadrat}} - A_{\text{Dreieck}} = 10 \cdot 10 - \frac{1}{2} \cdot (10 - x) \cdot 4$$



An den Längsseiten passen je Tisch 4 Personen und an den Breitseiten insgesamt 2, also

- $T(2) = 4 \cdot 2 + 2 = 10$
- $T(3) = 4 \cdot 3 + 2 = 14$
- $T(n) = 4 \cdot n + 2$

$$\begin{aligned} & (k - 4m)(3s - p) - (4m - 5k)(7s + 3p) \\ &= 3ks - kp - 12ms + 4mp - (28ms + 12mp - 35ks - 15kp) \\ &= 3ks - kp - 12ms + 4mp - 28ms - 12mp + 35ks + 15kp \\ &= 38ks + 14kp - 40ms - 8mp \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T(-1) &= \left(\frac{1}{6} - (-1) + (-1)^2\right) \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{13}{6} \cdot (-3) = -\frac{13}{2} \\ T(0) &= \left(\frac{1}{6} - 0 + 0^2\right) \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{6} \cdot (-3) = -\frac{1}{2} \\ T(1) &= \left(\frac{1}{6} - 1 + 1^2\right) \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{6} \cdot (-3) = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

GRUNDWISSEN 7. KLASSE

Umformen von Termen

Aufgabe 5/16

Ersetze jeweils \bigcirc , \square und Δ (bzw. \square und Δ) durch Terme, so dass eine wahre Gleichung entsteht:

- a) $(2a - \bigcirc)(11b + 3d) = 22ab + \square - \Delta - 21cd$
b) $(3a + \Delta)^2 = 9a^2 + \square + 4b^2$

GRUNDWISSEN 7. KLASSE

Umformen von Termen

Aufgabe 6/16

Faktoriere die folgenden Terme so weit wie möglich:

- a) $5x^2 + 30x + 45$
b) $7x^3 - 7x$

GRUNDWISSEN 7. KLASSE

Symmetrie von Figuren

Aufgabe 7/16


- a) Gib die Definitionseigenschaft der Raute an!
b) Gib an, ob die Raute symmetrisch ist und wenn ja, welche Art von Symmetrie vorliegt!
c) Nimm begründet Stellung zu folgender Aussage:
Eine Raute mit einem rechten Innenwinkel ist ein Quadrat.

GRUNDWISSEN 7. KLASSE

Winkelbetrachtungen an Figuren

Aufgabe 8/16

Bei Verwendung von Winkelbeziehungen sind jeweils Begründungen anzugeben. Berechne die Winkel τ und φ im Parallelogramm ABCD, wenn gilt: τ ist 1,5-mal so groß wie φ .



Umformen von Termen

- a) $5 \cdot (x^2 + 6x + 9) = 5 \cdot (x + 3)^2$
 b) $7x \cdot (x^2 - 1) = 7x \cdot (x + 1)(x - 1)$

Umformen von Termen

- a) mal $3d$ muss $21cd$ geben, also = $7c$
 Wegen des Pluszeichens ist = $2a \cdot 3d = 6ad$
 Es bleibt $\Delta = 7c \cdot 11b = 77bc$
- b) $\Delta = 2b$
 = $2 \cdot 3a \cdot 2b = 12ab$

Winkelbetrachtungen an Figuren

Verlängere \overline{AD} über A hinaus, dann ist der Nebenwinkel von τ so groß wie φ und sie ergänzen sich zu 180° . Damit ist:

$$\begin{aligned} \tau + \varphi &= 180^\circ \\ 1,5\varphi + \varphi &= 180^\circ \\ 2,5\varphi &= 180^\circ \\ \varphi &= 180^\circ : 2,5 = 180^\circ : \frac{5}{2} = 180^\circ \cdot \frac{2}{5} = 72^\circ \\ \tau &= 1,5 \cdot \varphi = 108^\circ \end{aligned}$$

Oder:

In einem Parallelogramm sind gegenüberliegende Winkel gleich groß. Deshalb:

$$2 \cdot \tau + 2 \cdot \varphi = 360^\circ \quad | : 2 \quad (\text{Innenwinkelsumme im Viereck } ABCD)$$

$$\tau + \varphi = 180^\circ$$

Weiter wie oben.

Symmetrie von Figuren

- a) Eine Raute ist ein Viereck mit vier gleich langen Seiten
 b) Achsensymmetrisch bzgl. der 2 Symmetrieachsen (= Diagonalen)
 Punktsymmetrisch bzgl. Diagonalschnittpunkt
 c) Die Aussage ist richtig, da diese Raute beide Bedingungen für ein Quadrat erfüllt:
- die Raute hat vier gleich lange Seiten
 - diese Raute hat auch 4 rechte Winkel, da der gegenüberliegende Winkel des rechten Winkels auch 90° betragen muss (Symmetrie) und die beiden restlichen Winkel aufgrund der Innenwinkelsumme des Vierecks und der Symmetrie ebenfalls je ein rechter Winkel sein müssen.

GRUNDWISSEN 7. KLASSE

Lineare Gleichungen

Aufgabe 9/16

Löse folgende Gleichung systematisch.

$$\frac{1}{2} \left(5 + 6 \frac{1}{2} x \right) + 3 = 4 \frac{3}{4} + 1 \frac{1}{2} x$$

GRUNDWISSEN 7. KLASSE

Lineare Gleichungen

Aufgabe 10/16

Löse folgende Gleichung systematisch.

$$(2x - 5)(x + 1) - 3x(3 - 2x) = 10 - 4x(5 - 2x)$$

GRUNDWISSEN 7. KLASSE

Lineare Gleichungen

Aufgabe 11/16

Fritz ist 3 Jahre älter als Lisa, Lisa ist 5 Jahre jünger als Alex.

Ihre Mutter ist 15-mal so alt wie Lisa.

Zusammen sind die Kinder 16 Jahre jünger als die Mutter.

Bestimme mithilfe einer geeigneten Gleichung das Alter von Lisa.

GRUNDWISSEN 7. KLASSE

Prozentrechnung und Daten

Aufgabe 12/16

Elektrogroßhändler Jupiter hat Filialen in Österreich und Deutschland.

Grundsätzlich kalkuliert er seine Preise in beiden Ländern gleich; in Österreich

beträgt der Mehrwertsteuersatz jedoch 20 %, in Deutschland nur 19 %. Er bietet in

Österreich einen Staubsauger zum Preis von 216 € (inklusive 20 % Mehrwertsteuer)

an.

- Berechne den Nettopreis des Staubsaugers!
- Berechne den Preis, den der Staubsauger in Deutschland kostet!
- Um wie viel Prozent muss der österreichische Kunde mehr als der deutsche Kunde bezahlen? Gib den Ansatz an, wie dies berechnet werden kann! (Ausrechnen ist nicht nötig!)

Lineare Gleichungen

$$\begin{aligned}
 2x^2 + 2x - 5x - 5 - 9x + 6x^2 &= 10 - 20x + 8x^2 \\
 8x^2 - 12x - 5 &= 10 - 20x + 8x^2 \quad | -8x^2 \\
 -12x - 5 &= 10 - 20x \quad | +20x \\
 8x - 5 &= 10 \quad | +5 \\
 8x &= 15 \quad | :8 \\
 \frac{15}{8} &= 1\frac{7}{8} \\
 x &= \frac{15}{8} = 1\frac{7}{8}
 \end{aligned}$$

Lineare Gleichungen

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2} \left(5 + \frac{13}{2}x \right) + 3 &= \frac{19}{4} + \frac{3}{2}x \\
 \frac{5}{2} + \frac{13}{4}x + 3 &= \frac{19}{4} + \frac{3}{2}x \quad | \cdot \text{Hauptnenner } 4 \\
 10 + 13x + 12 &= 19 + 6x \\
 22 + 13x &= 19 + 6x \quad | -6x \\
 22 + 7x &= 19 \quad | -22 \\
 7x &= -3 \quad | :7 \\
 x &= -\frac{3}{7}
 \end{aligned}$$

Prozentrechnung und Daten

- a) Gegeben: $PW = 216 \text{ €}$; $PS = 100\% + 20\% = 120\% = 1,2$
 Gesucht: GW
 $GW = PW : PS = 216 \text{ €} : 1,2 = 2160 \text{ €} : 12 = 180 \text{ €}$
- b) Gegeben: $GW = 180 \text{ €}$; $PS = 100\% + 19\% = 119\% = 1,19$
 Gesucht: PW
 $PW = PS \cdot GW = 1,19 \cdot 180 \text{ €} = 214,20 \text{ €}$
- c) Gegeben: $GW = 214,20 \text{ €}$; $PW (= \text{Unterschied}) = 1,80 \text{ €}$
 Gesucht: PS
 $PS = PW : GW = 1,80 \text{ €} : 214,20 \text{ €}$
Alternativ: $GW = 214,20 \text{ €}$; $PW = 216 \text{ €}$
 Gesucht: PS
 $PS = PW : GW = 216 \text{ €} : 214,20 \text{ €} \Rightarrow \text{Notwendiger Abgleich mit } 100\%$

Lineare Gleichungen

- 1) Festlegen der Variable, z.B.: $x = \text{Alter von Lisa}$
 2) Darstellen der anderen Größen mit Hilfe von x :
 $x + 3 = \text{Alter von Fritz}$
 $x + 5 = \text{Alter von Alex}$
 $15x = \text{Alter der Mutter}$
 3) Gleichung:
 $x + x + 3 + x + 5 = 15x - 16$
 $3x + 8 = 15x - 16 \quad | -15x$
 $-12x + 8 = -16 \quad | -8$
 $-12x = -24 \quad | : (-12)$
 $x = 2 \quad \Rightarrow \text{Lisa ist 2 Jahre alt}$

GRUNDWISSEN 7. KLASSE

Prozentrechnung und Daten

Aufgabe 13/16

Der Wert eines Autos nimmt in den ersten beiden Jahren nach dem Kauf um jeweils 20 % ab. Danach sinkt der Wert nur noch durchschnittlich um 10 %.

- Berechne, um wie viel Prozent der Wert des Autos nach 4 Jahren insgesamt gesunken ist. (Runde das Ergebnis auf ganze Prozent.)
 - Wie viel hat ein VW-Bus ursprünglich gekostet, wenn sein Wert nach 4 Jahren nur noch 30326,40 € beträgt?
Gib den Ansatz an, wie dies berechnet werden kann.
(Ausrechnen ist nicht nötig!)
- Falls a) nicht berechnet werden konnte, verwende das Ergebnis 40 %.

GRUNDWISSEN 7. KLASSE

Kongruenz

Aufgabe 14/16

Entscheide jeweils (ohne Konstruktion), ob die Konstruktion eines Dreiecks aus den folgenden Bestimmungsstücken grundsätzlich möglich ist und wenn ja – ob sie dann eindeutig ist.

Begründe jeweils mithilfe eines Kongruenzsatzes.


- $a = 5 \text{ cm}, b = 8 \text{ cm}, \gamma = 100^\circ$
- $a = 2,5 \text{ cm}, b = 6,2 \text{ cm}$ und $c = 3,9 \text{ cm}$
- $c = 7 \text{ cm}, b = 8,2 \text{ cm}$ und $\gamma = 46^\circ$

GRUNDWISSEN 7. KLASSE

Besondere Dreiecke

Aufgabe 15/16

In der abgebildeten Figur gilt: $\alpha = \sphericalangle MAC = 20^\circ$ und $\sphericalangle DMC = 90^\circ$.
A, B, C und D liegen auf einem Kreis um M.



Berechne φ , μ und τ . Begründe jeweils in Stichpunkten.

GRUNDWISSEN 7. KLASSE


Besondere Dreiecke

Aufgabe 16/16

Der Satz von Thales lautet:

Wenn in einem Dreieck ABC der Punkt C auf dem Kreis mit dem Durchmesser $|\overline{AB}|$ liegt, dann hat das Dreieck bei C einen rechten Winkel.

- Beweise diesen Satz.
- Formuliere den Kehrsatz.



- a) Konstruktion ist möglich und eindeutig (SWS)
 b) Konstruktion ist möglich (Dreiecksungleichung ist erfüllt, da $a + c > b$) und eindeutig (SSS)
 c) Konstruktion ist eventuell möglich, aber nicht eindeutig, da der gegebene Winkel γ der Gegenwinkel der kleineren Seite ist (kein SsW).

- a) Gegeben: $PS_1 = PS_2 = 100\% - 20\% = 80\% = 0,8$
 $PS_3 = PS_4 = 100\% - 10\% = 90\% = 0,9$
 Gesucht: $PS_{\text{insg.}}$
 $PS_{\text{insg.}} = 0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,9 \cdot 0,9 = 0,64 \cdot 0,81 = 0,5184 \approx 52\%$
 Der Wert des Autos ist auf rund 52 % gesunken, **also um rund 48 %**.
- b) Gegeben: $PW = 30326,40 \text{ €}$; $PS = 51,84\% = 0,5184$
 Gesucht: GW
 $GW = PW : PS$
 $GW = 30326,40 \text{ €} : 0,5184$

- a) ΔAMC ist gleichschenkelig, denn $|\overline{MA}| = |\overline{MC}| = r \Rightarrow \alpha = \gamma_1$
 (Basiswinkel)
 ΔMBC ist gleichschenkelig, denn $|\overline{MB}| = |\overline{MC}| = r \Rightarrow \beta = \gamma_2$
 (Basiswinkel)
 $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 = \alpha + \beta$
 $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$ (Innenwinkelsumme des Dreiecks ABC)
 $\gamma + \gamma = 180^\circ$
 $2\gamma = 180^\circ \quad | :2$
 $\gamma = 90^\circ$
- b) Wenn das Dreieck ABC bei C einen rechten Winkel hat, dann liegt der Punkt C auf dem Kreis mit dem Durchmesser $|\overline{AB}|$.

- $\varepsilon = \alpha = 20^\circ$ (Basiswinkel im gleichschenkligen Dreieck AMC)
 $\varphi = 180^\circ - 2\alpha = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$ (Innenwinkelsumme im Dreieck AMC)
 $90^\circ + \varphi + \mu = 360^\circ$ (Vollwinkel bei M)
 $90^\circ + 140^\circ + \mu = 360^\circ \Rightarrow \mu = 360^\circ - 230^\circ = 130^\circ$
 $\tau = (180^\circ - \mu) : 2 = (180^\circ - 130^\circ) : 2 = 50^\circ : 2 = 25^\circ$
 (Innenwinkelsumme im gleichschenkligen Dreieck ADM)